



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

ранней диагностики и лечения
онкологических заболеваний

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ ПРОШЕДШЕМУ ПРОЦЕДУРУ ПЭТ-КТ.

Вам вводился радиофармпрепарат F^{18} фтордезоксиглюкоза (F^{18} ФДГ).

По завершению исследования на выходе из диагностического отделения ММЦ РДиЛОЗ рекомендуется:

- Избегать пребывания в местах массового скопления людей в течение 2 часов с момента выхода из диагностического отделения (общественный транспорт,)
- Дистанцироваться на расстояние 1 метра от беременных и кормящих женщин, маленьких детей в течение 2 часов с момента выхода из диагностического отделения.
- Для скорейшего выведения радиофармпрепарата пейте больше жидкости.
- В течение **24 часов** с момента проведения ПЭТ-КТ воздержитесь от диагностических процедур, связанных с лучевой нагрузкой (рентгенография, компьютерная томография, радионуклеидные исследования), инвазивных диагностических процедур (ФГДС, колоноскопия и пр.) проведения химиотерапии и лучевой терапии, оперативных вмешательств.